Vergleichen Sie unsere Produkte

	Voltaren Schmerzgel mit Komfort-Applikator	**Voltaren Schmerzgel**	**Voltaren Schmerzgel forte**	**Voltaren Dolo**	**Voltaren Dolo Liquid**	**Voltaren Wirkstoff-Pflaster**	**Voltaflex**
DARREICHUNGS-FORM	Voltaren Schmerzgel ist das Schmerzgel mit der 3-fach-Wirkung und dank des Komfort-Applikators bleiben die Hände beim Auftragen sauber.	Emulsionsgel mit dem Wirkstoff Diclofenac zum Auftragen und Einreiben	Emulsionsgel mit doppelter Konzentration des Wirkstoffs Diclofenac (im Vergleich zu 1%igen Gelen) zum Auftragen auf die Hautt.	Überzogene Tablette zum Einnehmen	Weichkapsel zum Einnehmen	Pflaster mit dem Wirkstoff Diclofenac zum Aufkleben auf die Haut	Tablette mit Glucosamin zum Einnehmen. Zur Förderung der Gelenkgesundheit
ANWENDUNGSGEBIET	Zur Behandlung von lokalisierbaren Rückenschmerzen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren).	Zur Behandlung von lokalisierbaren Rückenschmerzen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren).	Zur Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen infolge stumpfer Traumen, z. B. Sport- oder Unfallverletzung (zugelassen für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren).	Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen (z. B. akute Bewegungsschmerzen).	Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen (z. B. akute Bewegungsschmerzen).	Zur Behandlung von akuten Verstauchungen und Zerrungen des Knöchels sowie bei dem sogenannten Tennisarm.	Behandlung der Symptome/Beschwerden bei leichter bis mittelschwerer Kniegelenksarthrose
VORTEILE/ BESONDERHEITEN	• Einfach in Anwendung • Stoppt den Schmerz, bekämpft die Entzündung & beschleunigt die Heilung	• Stoppt den Schmerz, bekämpft die Entzündung & beschleunigt die Heilung • Das Emulsionsgel pflegt und kühlt zugleich	• Nur zweimal täglich anwenden – bevorzugt morgens und abends • Doppelte Konzentration des Wirkstoffs Diclofenac sorgt für effektive Schmerzlinderung und Entzündungshemmung • Diclofenac dringt schnell und tief ein und konzentriert sich gezielt am Ort der Entzündung	• Klassische Darreichungsform • Enthält den bewährten Voltaren-Wirkstoff • Wirkt gezielt am Schmerzort und konzentriert sich an der entzündeten Stelle • Der hochpotente Wirkstoff erlaubt eine niedrige Dosierung	• Moderne Darreichungsform • Der flüssige Wirkstoff liegt bereits vollständig gelöst vor und steht deshalb schnell zur Verfügung* • Der hochpotente Wirkstoff stoppt den Schmerz und bekämpft gezielt die Entzündung, häufig die Ursache von Bewegungsschmerzen	• Langanhaltende Wirkung (bis zu 24 Stunden): Schmerzlindernd und entzündungshemmend • Praktische Anwendung und ideal für unterwegs: passt sich direkt dem Körper an • Diskret unter der Kleidung zu tragen • Sanft zur Haut, gut haftend und leicht abzulösen	Der körpereigene Baustein Glucosamin stärkt das Knorpelgewebe der Gelenke und fördert somit die Gelenkgesundheit langfristig: Stimuliert den Gelenkknorpel Regt die Bildung von Gelenkflüssigkeit an Lindert Arthroseschmerzen im Kniegelenk langfristig
DOSIERUNG	Drei- bis viermal täglich Je nach Größe der schmerzenden Stelle eine kirsch- bis walnussgroße Menge auftragen	• Drei- bis viermal täglich, abhängig von der Schmerzintensität • Je nach Größe der schmerzenden Stelle kirsch- bis walnussgroße Menge auftragen	• Zweimal täglich, also alle 12 Stunden (bevorzugt morgens und abends) • Je nach Ausmaß der schmerzenden Stelle eine kirsch- bis walnussgroße Menge auftragen und einreiben	• Anfangsdosis von einer Tablette 25 mg • Danach je nach Bedarf eine Tablette alle vier bis sechs Stunden Die Tagesdosis sollte drei Tabletten (75 mg) nicht überschreiten • Die Tablette mit ausreichend Flüssigkeit und am besten 1-2 Stunden vor einer Mahlzeit einnehmen	• Anfangsdosis von einer Weichkapsel 25 mg • Danach je nach Bedarf eine Weichkapsel alle vier bis sechs Stunden • Die Tagesdosis sollte drei Weichkapseln (75 mg) nicht überschreiten • Die Weichkapsel mit ausreichend Flüssigkeit und am besten vor einer Mahlzeit einnehmen	Ein- bis zweimal täglich, abhängig von dem Anwendungsgebiet (bei Tennisellenbogen je morgens und abends aufkleben; bei Verstauchungen oder Zerrungen des Knöchels 1x pro Tag aufkleben) Das Wirkstoff-Pflaster wird spätestens nach 24 Stunden entfernt.	Zwei Tabletten (einmal am Tag) Die Tablette sollte mit etwas Flüssigkeit geschluckt werden und kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden
ANWENDUNGS-DAUER	Das Emulsionsgel kann an bis zu 21 aufeinanderfolgenden Tagen auf die schmerzende Stelle aufgetragen werden, Abhängig von den Symptomen. Sollten sich die Beschwerden jedoch nach drei bis fünf Tagen nicht verbessern oder gar verschlechtern, konsultieren Sie Ihren Arzt.	Das Emulsionsgel kann an bis zu 21 aufeinanderfolgenden Tagen auf die schmerzende Stelle aufgetragen werden, Abhängig von den Symptomen. Sollten sich die Beschwerden jedoch nach drei bis fünf Tagen nicht verbessern oder gar verschlechtern, konsultieren Sie Ihren Arzt.	Das Emulsionsgel wird in der Regel über 1 bis 3 Wochen angewendet, abhängig von den Symptomen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist eine Kurzzeitanwendung bis zu 7 Tagen vorgesehen. Für darüber hinausgehende Behandlungen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.	Die Tabletten können bis zu vier Tage ohne ärztlichen Rat eingenommen werden. Bei stärkeren oder länger andauernden Beschwerden sollten Sie mit Ihrem Arzt die Ursachen bzw. die Therapie abklären.	Die Weichkapseln können bis zu vier Tage ohne ärztlichen Rat eingenommen werden. Bei stärkeren oder länger andauernden Beschwerden sollten Sie mit Ihrem Arzt die Ursachen bzw. die Therapie abklären.	Das Wirkstoff-Pflaster kann bei Verstauchungen und Zerrungen des Knöchels bis zu drei Tage lang angewendet werden. Bei dem sogenannten Tennisarm ist die Anwendung maximal 14 Tage möglich. Sollten sich die Beschwerden nach drei bis fünf Tagen nicht verbessern oder gar verschlechtern, konsultieren Sie Ihren Arzt.	Glucosamin fördert die Gelenkgesundheit und lindert langfristig die Arthroseschmerzen im Kniegelenk. Eine Schmerzlinderung tritt evtl. erst nach mehrwöchiger Behandlung ein. Ist nach zwei bis drei Monaten keine Linderung zu spüren, kontaktieren Sie Ihren Arzt.
ZUSAMMENSETZUNG	1 g Gel enthält 11,6 mg Diclofenac, Diethylaminsalz als arzneilich wirksamen Bestandteil, entsprechend 10 mg Diclofenac-Natrium.	1 g Gel enthält 11,6 mg Diclofenac, Diethylaminsalz als arzneilich wirksamen Bestandteil, entsprechend 10 mg Diclofenac-Natrium.	1 g Gel enthält 23,2 mg Diclofenac, Diethylaminsalz als arzneilich wirksamen Bestandteil, entsprechend 20 mg Diclofenac-Natrium.	1 überzogene Tablette enthält: Diclofenac-Kalium 25 mg.	1 Weichkapsel. enthält 25 mg Diclofenac-Kalium.	Ein wirkstoffhaltiges Pflaster enthält 180 mg Diclofenac-Epolamin, entsprechend 140 mg Diclofenac Natrium (1% m/m).	625 mg Glucosamin (entsprechend 750 mg Glucosaminhydrochlorid).
PACKUNGSGRÖßE	100 g und 150 g Tube (inkl. Komfort-Applikator).	60 g, 120 g, 150 g und 180 g Tube (inkl. Komfortverschluss)	100 g und 150 g Tube (inkl. Komfort-Verschluss)	25 mg Tabletten in Packungen zu 10 und 20 Tabletten	25 mg Weichkapseln in Packungen zu 10 und 20 Kapseln	Packungen mit 2 und 5 wirkstoffhaltigen Pflastern	750 mg Tabletten in Packungen zu 30, 60 und 180 Tabletten